

# Метеорологическій и сельскохозяйственный бюллетень

## ПРИКАМСКОЙ СѢТИ

за октябрь 1898 года.

Съ 19 сентября и по 20 октября, или октябрь мѣсяць новаго стила отличался чрезвычайною погодою. Ранніе морозы и ранняя выпадка снѣговъ, неоднократное прохождение снѣжныхъ циклоновъ съ сѣвера къ Уралу, отсутствіе нормальнаго тепла—вотъ главныя особенности октябрьской погоды. Рассмотримъ эти явленія нѣсколько подробнѣе.

Температура воздуха въ теченіе мѣсяца во всемъ краѣ держалась ниже нормальной: на сѣверѣ на  $4^{\circ}$  и на  $5^{\circ}$ , а въ южныхъ уѣздахъ на  $2^{\circ}$  и на  $3^{\circ}$ .

Быстро нахлынувшая морозная волна съ сѣвера, упорно господствовала въ приуральѣ, повышаясь только днемъ до таянія снѣга иногда на сѣверѣ до  $+3^{\circ}$ , на югѣ  $+8^{\circ}$ . Однако въ половинѣ мѣсяца въ теченіе недѣли снова проходилъ широкой полосой еще болѣе сильный морозъ до  $-15^{\circ}$ , уже вполне заковавшій льдомъ мелкія рѣвки, пруды и озера, даже и на Камѣ показался крупный ледоходъ, прекратившій водяное сообщеніе, вслѣдствіе чего много разныхъ судовъ съ грузамъ не дошли до мѣста своего назначенія и по необходимости остановились въ льдахъ на пути по р. Камѣ.

Вслѣдствіе ненормально значительныхъ холодовъ осадки выпадали повсемѣстно въ видѣ снѣга, показывавшагося въ первый разъ съ начала мѣсяца. Снѣгъ выпадалъ почти ежедневно и въ такомъ количествѣ, что почти черезъ 2 недѣли повсюду установился зимній путь. Правда, днемъ часто снѣгъ притаивалъ, но все же большая часть его оставалась, увеличиваясь новыми выпадками, особенно со второй половины, такъ что въ концѣ мѣсяца глубина его опредѣлялась въ трехъ сѣверныхъ уѣздахъ около 20 сантиметровъ, въ Оханскомъ уѣздѣ около 15 сантим., въ Осинскомъ до—10, исключая Бѣлогорской мѣстности, гдѣ было холоднѣе на  $2^{\circ}$  и снѣгу глубже втрое. Въ Кунгурскомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ глубина снѣжнаго покрова распредѣлялась неравномѣрно: къ Уральскимъ горамъ она увеличивалась, а съ удаленіемъ отъ нихъ уменьшалась. Это вліяніе Уральского хребта отчасти замѣтно и въ остальныхъ сѣверныхъ уѣздахъ.

Не смотря почти на ежедневно выпадавшіе осадки, въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ, количество ихъ за мѣсяць опредѣлено менѣе нормальнаго, а въ прочихъ уѣздахъ, напротивъ, часто болѣе нормальнаго.

Измѣреніе осадковъ въ цифрахъ выразилось такъ:

Въ Чердынскомъ уѣздѣ	отъ . . .	29 до 36	миллим.
„ Соликамскомъ „	„ „ . . .	26 „ 63	„
„ Пермскомъ „	„ „ . . .	28 „ 77	„
„ Оханскомъ „	„ „ . . .	32 „ 60	„
„ Осинскомъ „	„ „ . . .	30 „ 60	„
„ Кунгурскомъ „	„ „ . . .	22 „ 64	„
„ Красноуфимскомъ уѣздѣ	отъ . . .	49 „ 67	„

Въ восточныхъ уѣздахъ съ удаленіемъ отъ Уральскаго хребта количество осадковъ уменьшается, особенно на юго-востоку губерніи.

Такъ какъ снѣгъ выпадалъ обильно въ теченіе всего мѣсяца на талую землю, вслѣдствіе чего и озими подъ снѣгомъ находились долго не замерзшими, то сельское населеніе въ среднихъ и южныхъ уѣздахъ сильно опасалось за ихъ состояніе.

Къ ненормально холодной и снѣжной, какъ особенности въ этомъ мѣсяцѣ, надо прибавить еще отсутствіе солнечныхъ дней, обильную влажность въ воздухѣ, а отсюда и слабое испареніе.

Кама и другія рѣки отличались сильнымъ мелководіемъ при замерзаніи, что было, разумѣется, послѣдствіемъ сухаго и теплаго лѣта. Во многихъ мѣстахъ, какъ уже и было сообщено въ предыдущихъ бюллетеняхъ, высыхали озера и болота, а теперь наблюдатели замѣчаютъ не только обмеленіе рѣкъ, но даже и высыханіе колодцевъ.

Необычная теплота и засуха лѣтомъ, какъ уже извѣстно, была одной главной причиной недорода яровыхъ и травъ, вслѣдствіе чего сельское населеніе, особенно южныхъ уѣздовъ, значительно озабочено трудностью прокормить зимою домашній скотъ. Опасенія вызвали упадокъ цѣны на послѣднихъ вдвое и даже втрое противъ обыкновенныхъ.